





PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO





MAPA 16 RÓŻNORODNOŚĆ KRAJOBRAZU

Skala 1:2 500 000
0 25 50 75 100 km

Wskaźnik różnorodności krajobrazu
Shannona-Wienera

0 1,0 1,6 2,0 2,3 2,6 3,0

(według udziału naturalnych i seminaturalnych płatów Corine Land Cover 2006)

Typy krajobrazu naturalnego
(według A. Richlinga, zgeneralizowane)


- zalewowe dna dolin i obniżenia
- niżowe młodoglacjalne równinne i faliste oraz tarasy nadzalewowe o różnym wieku
- niżowe młodoglacjalne pagórkowate i wzgórzowe
- niżowe peryglacjalne równinne i faliste oraz eoliczne
- niżowe peryglacjalne pagórkowate i wzgórzowe
- wyżynne lessowe, węglanowe i gipsowe
- wyżynne krzemianowe i glinokrzemianowe
- górskie regły dolnego i górnego
- wysokogórskie

obszary o dużym zróżnicowaniu rzeźby terenu
odchylenia standardowe wysokości względnych w polach o powierzchni 3 km² - powyżej 10 m;
na podstawie danych satelitarnych SRTM-3 o rozdzielczości 3" (według P. Śleszyńskiego)

Granice jednostek fizycznogeograficznych (według J. Kondrackiego)

prowincji podprowincji makroregionów mezoregionów

Las



Udział powierzchni lasów (2009)

0 10 20 30 40 50 69%

Udział lasów prywatnych

0 30 50 99%

Zmiany powierzchni
w latach 2004-2009

3795 ha
 1000
 200
 przyrost ubytek